

Precauciones:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO.

NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Medidas precautorias generales:

Durante la preparación y la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Qúites la ropa de trabajo y lávela separada de la vestimenta diaria, antes de volverla a usar. Puede causar reacción alérgica a la piel.

Riesgos para la salud humana

Clase Toxicológica II (PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO).

Grupos Químicos: **Bixfen:** Pyrazolecarboxamida. **Prothioconazole:** Triazol. **Trifloxystrobin:** Estrobilurinas.

Riesgos Ambientales:

Toxicidad para aves: prácticamente no toxico

Toxicidad para peces: producto muy tóxico. Se recomienda dejar una franja de seguridad de 5 metros entre la aplicación y el curso de agua. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización.

Toxicidad para abejas: virtualmente no toxico para abejas.

Tratamiento de remanentes y caldos de aplicación:

Los mismos debe ser eliminados en forma segura, sin contaminar el ambiente. Los restos de caldo de aplicación o agua de lavado que no se utilicen NO deben ser asperjados en áreas no cultivadas o del tránsito habitual de personas y animales y, a su vez, no deben ser arrojados a fuentes de agua (canales, arroyos, etc). En caso de contar con Cama Biológica recolectar el caldo remanente en un tanque, verterlo sobre la misma o gestionar su disposición final como residuo peligroso. En su defecto, diluirlo 1:10 veces y aplicarlo en el cultivo, respetando todos los cuidados que hay que tener al momento de la pulverización.

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/4 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. Realizar este procedimiento 3 veces. Vierta el agua del lavado en el tanque del equipo aplicador de manera que sea utilizado para la aplicación. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. De contar con el equipamiento también se puede realizar el lavado a presión de acuerdo a la normativa vigente. Los envases previamente inutilizados, deberán ser recogidos por CAMPOLIMPIO- Programa de manejo de envases vacíos-CAFYF-CropLife.



Almacenamiento:

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

Instrucciones en caso de accidentes

Contacte a las autoridades locales competentes y a la empresa (Bayer S.A. Tel: 021- 617 3000 Fax: 617 3501).

Aisle y señalice el área contaminada.

Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

Equipos de Protección Personal:

Mezcla / carga: guantes, camisa de manga larga, pantalones largos, calzado resistente, delantal de goma, careta o gafas.

Aplicación y reingreso: guantes, camisa de manga larga, pantalones largos, calzado resistente, gafas

Primeros Auxilios:

Si se necesita atención médica: Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Aleje al paciente del área de peligro. Contacto con los ojos: enjuague bien los ojos con agua (tibia). Consulte al oftalmólogo, si los síntomas persisten.

Contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico, si los síntomas persisten o aparecen. Ingestión/tragar: No provocar el vómito. Llévelo al médico y lleve el envase con usted. Inhalación: Llevar al aire libre, si presenta síntomas (p. ej., dificultad para respirar, tos persistente), llevar al médico y llevar el envase del producto. No se recomienda el lavado gástrico. El tratamiento es sintomático y de apoyo en ausencia de un antídoto y de mayor toxicidad.

Advertencia para el médico: PRODUCTO CLASE II – MODERADAMENTE PELIGROSO. Puede causar reacción alérgica a la piel

Síntomas de intoxicación aguda: No se conocen síntomas específicos.

Consultas en caso de intoxicación

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social-Emergencias Médicas Gral. Santos esq. Teodoro S. Mongelós - Teléfono (021) 220 418 y/o a los teléfonos de la distribuidora del plaguicida

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El fabricante no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza, derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Group 11 13 17 FUNGICIDE

CRIPTON® XPRO

Suspensión concentrada (SC)

Fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica

Composición

Bixafen: N-(3',4'-dicloro-5-fluoro [1,1'-bifenil]-2-il)- 3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida	125,0 g/L (12,5 % p/v)
protioconazol: 2-[2-(1-clorocidopropil)-3-(2-clorofenil)-2 hidroxipropil]-1,2-dihidro-3H-1,2,4- triazol-3-tioná	175,0 g/L (17,5 % p/v)
trifloxistrobin: (E) α-(metoximino)-2-[[(E) - [1-3- (Trifluorometil) fenil] etiliden] amino]oxilmetil] bencén acetato de metilo	150,0 g/L (15,0 % p/v)
coadyuvantes c.s.p.	550 g/L (55,0 % pv)

Grupos Químicos: Bixafen: Pyrazolcarboxamida. Protioconazol: Triazol. Trifloxistrobina: Estrobilurina.

Reg. SENAVE N°: 5.110 Cert. De Libre Venta N°: 5.217

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

No inflamable. No corrosivo. No explosivo

Contenido: 5 Litros

Lote N° y Vencimiento: Ver en el envase.

PY 86706563b 10/2022

Fabricado en Argentina por: BAYER S.A.

División Agrícola. Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652

B1605EHD - Munro, Bs.As.

Registrado en Paraguay por: **Bayer S.A.**

Av. Sta. Teresa 2.245 c/ Av. del Chaco

Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501

Asunción - Paraguay - Reg. SENAVE N°: 31



NOCIVO



ABRIR
AQUÍ

Generalidades: El producto formulado **CRIPTON® XPRO** es un fungicida de acción sistémica y mesostemica a base de Bixafen, Trifloxistrobina y Protiokonazol. Debe ser utilizado de manera preventiva en relación a la aparición de enfermedades, garantizando así el mayor potencial del control de enfermedades.

Preparación: Agregar agua al tanque de la máquina pulverizadora hasta aproximadamente la mitad de su capacidad y poner en marcha el sistema de agitación. Incorporar la cantidad requerida de **CRIPTON® XPRO** al tanque y continuar la agitación, completando el llenado del tanque con agua.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación: **CRIPTON® XPRO** puede ser aplicado con las pulverizadores convencionales de bajo volumen ya sean de arrastre o autopropulsadas siempre que estén provistas de un agitador mecánico adecuado o una bomba capaz de producir un exceso de flujo tal, de modo de mantener una remoción constante a través del retorno.

Los equipos de aplicación deben ubicar a los aspersores en la parte trasera del tractor y el asiento del operador debe estar ubicado sobre la altura del aguilón o línea de aspersión.

Es importante provocar un buen mojado de las plantas; para ello, se deben lograr aplicar entre 50 y 70 gotas /cm²; utilizando un volumen de agua orientativo que no debe ser menor a 150 litros de agua por hectárea en aplicaciones terrestres.

Es conveniente verificar el correcto funcionamiento del equipo previo a la aplicación y calibrarlo con agua sobre el mismo terreno en que se va a utilizar. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a 10 km/h.

No aplicar en exceso y evitar la deriva hacia áreas no objeto de control.

No aplicar con equipos de aspersión manual.

No está recomendada la utilización de **CRIPTON® XPRO** para aplicaciones aéreas.

Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS	ENFERMEDAD	MOMENTO DE APLICACIÓN
SOJA (<i>Glycine max</i>)**	500 ml/ha*	Roya asiática (<i>Phakopsora pachyrhizi</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum truncatum</i>) Septoriosis (<i>Septoria glycines</i>) Mancha alvo (<i>Corynespora cassiicola</i>)	-Aplicar los tratamientos en estadio fenológico Vn en aplicación preventiva (final de la fase vegetativa, si hubiere aparición de las primeras pústulas de Roya) para Roya, Mancha alvo, y Antracnosis. -Aplicar los tratamientos 21 días después de la primera aplicación considerada como preventiva.
MAÍZ (<i>Zea mays</i>)	400 - 500 ml/ha *	Roya - comun (<i>Puccinia sorghi</i>)	Realizar el monitoreo periódico del área e iniciar las aplicaciones de manera preventiva, durante el estadio vegetativo del maíz o al constatar los primeros síntomas de la enfermedad. Continuar con el monitoreo del cultivo en condiciones meteorológicas propicias para la reaparición de la enfermedad, realizar una segunda aplicación con un intervalo de 15 días. Realizar como máximo 2 aplicaciones por ciclo del cultivo. Si fuesen necesarias mas de 2 aplicaciones, utilizar fungicidas de mecanismo de acción diferentes que el Cripton® Xpro
	500 ml/ha*	-Mancha blanca (<i>Phaeosphaeria maydis</i>) Roya polysora (<i>Puccinia polysora</i>) Tizón foliar del maíz o Helminthosporiosis común (<i>Exserohilum turcicum</i>) Cercospora (<i>Cercospora zeae-maydis</i>) Tizón de la hoja o mancha foliar por bipolaris (<i>Bipolaris-maydis</i>)	
TRIGO (<i>Triticum sp.</i>)	500 ml/ha*	-Roya de la hoja (<i>Puccinia tritica</i>) Mancha amarilla de la hoja (<i>Dreschlera tritici repentis</i>) Giberela o Fusariosis (<i>Fusarium graminearum</i>)	Roya de la hoja: iniciar la primera aplicación a partir de los primeros síntomas, hasta un máximo del 1% de incidencia foliar. Continuar con el monitoreo del cultivo, observando las condiciones meteorológicas favorables al desarrollo de la enfermedad y caso sea necesario realizar las demás aplicaciones con intervalos de 15 días. Realizar como máximo 4 aplicaciones por ciclo del cultivo. Mancha amarilla: comenzar el monitoreo de la enfermedad desde la fase de macollaje. La primera aplicación debe llevarse a cabo de forma preventiva o desde los primeros síntomas de la enfermedad. Continuar con el monitoreo de cultivos, observar las

		condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y, si es necesario, llevar a cabo las otras aplicaciones con intervalos 15 días. Realizar un máximo de cuatro aplicaciones por ciclo de cultivo. Giberella: bajo condiciones meteorológicas favorables al desarrollo del hongo (temperaturas entre 20 y 25°C y precipitaciones pluviales como mínimo de 48 horas consecutivas), realizar una aplicación preventiva en floración, cuando se observa el mayor número de flores abiertas en el cultivo. Observe las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad y, si es necesario, vuelva a aplicar el producto dentro de los 10 días. Realizar un máximo de dos aplicaciones por ciclo de cultivo. La dosis más alta debe usarse cuando las condiciones de temperatura y humedad relativa del aire son más propicias para el desarrollo del hongo. o cuando se utilizan cultivos con mayor sensibilidad a la enfermedad.
--	--	--

* Aplicar con 0.3 L/ha de Coadyuvante Optimizer en aplicaciones de caudales a partir de 150 litros/ha.

Restricciones de uso:

Dejar transcurrir el siguiente periodo entre última aplicación y cosecha:

Soja: 30 días.

Maíz: 15 días

Trigo: 30 días

No ingrese al área tratada antes de que la pulverización realizada se haya secado por completo durante al menos 12 horas después de la aplicación.

El reingreso al cultivo para la tarea de despanojado puede realizarse luego de que el producto aplicado haya secado, con el equipo completo (camisa de manga larga y pantalones largos) y deben utilizarse guantes resistentes a productos químicos durante los 5 días posteriores a la aplicación.

Advertencia: La experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes a la Trifloxistrobina y/o Protiokonazol, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y disminución del rendimiento. Dado que Bayer no puede prever el desarrollo de una resistencia, ésta no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad de **CRIPTON® XPRO** contra estas posibles cepas resistentes. No aplicar **CRIPTON® XPRO** más de tres veces consecutivas durante un ciclo de producción.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

Compatibilidad: es recomendable realizar pequeñas pruebas de compatibilidad física y biológica previamente a proceder a incorporar las diferentes combinaciones en el tanque del equipo de aplicación.

Fitotoxicidad: **CRIPTON® XPRO** no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



Group 11 | 3 | 7 FUNGICIDE

CRIPTON® XPRO

Suspensión concentrada (SC)

Fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica

Composición

Bixafen: N-(3',4'-dicloro-5-fluoro [1,1'-bifenil]-2-il)-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida 125,0 g/L (12,5 % p/v)

protiokonazole: 2-[2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2 hidroxipropil]-1,2-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-iona 175,0 g/L (17,5 % p/v)

trifloxistrobin: (E) α-(metoxiimino)-2-[[[(E) - [1-3- (Trifluorometil) fenil] etiliden] amino]oxil]metil] bencén acetato de metilo..... 150,0 g/L(15,0 % p/v)

coadyuvantes c.s.p. 550 g/L (55,0 % pv)

Grupos Químicos: Bixafen: Pirazolcarboxamida. Protiokonazol: Triazol. Trifloxistrobina: Estrobilurina.

Reg. SENAVE Nº: 5.110 Cert. De Libre Venta Nº: 5.217

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

No inflamable. No corrosivo. No explosivo

Contenido: 5 Litros

Lote N° y Vencimiento: Ver en el envase.

Fabricado en Argentina por: BAYER S.A.
División Agrícola. Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652
B1605EHD - Munro, Bs.As.

Registrado en Paraguay por: **Bayer S.A.**
Av. Sta. Teresa 2.245 c/ Av. del Chaco
Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501
Asunción - Paraguay - Reg. SENAVE Nº: 31

NOCIVO

PY 86706563b 10/2022



Group 11 I 3 I 7 FUNGICIDE

CRIPTON[®] XPRO

Suspensión concentrada (SC)

Fungicida foliar de acción sistémica y mesostémica

Composición

Bixafen: N-(3',4'-dicloro-5-fluoro [1,1'-bifenil]-2-il)- 3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida	125,0 g/L (12,5 % p/v)
protioconazole: 2-[2-(1-clorocidopropil)-3-(2-clorofenil)-2 hidroxipropil]-1,2-dihidro-3H-1,2,4- triazol-3-tiona	175,0 g/L (17,5 % p/v)
trifloxistrobin: (E) α-(metoxiimino)-2-[[[(E) - [1-3- (Trifluorometil) fenil] etiliden] amino]oxilmetil] bencén acetato de metilo	150,0 g/L (15,0 % p/v)
coadyuvantes c.s.p.	550 g/L (55,0 % pv)

Grupos Químicos: Bixafen: Pirazolcarboxamida. Protiocanazol: Triazol. Trifloxistrobina: Estrobilurina.

Reg. SENAVE N°: 5.110 Cert. De Libre Venta N°: 5.217

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

No inflamable. No corrosivo. No explosivo

Contenido: 5 Litros

Lote N° y Vencimiento: Ver en el envase.

Fabricado en Argentina por: BAYER S.A.
División Agrícola. Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652
B1605EHD - Munro, Bs.As.

Registrado en Paraguay por: **Bayer S.A.**
Av. Sta. Teresa 2.245 c/ Av. del Chaco
Tel: (021) 617 3500 Fax: 617 3501
Asunción - Paraguay - Reg. SENAVE N°: 31



NOCIVO

